

CONCORSO ORTOTTISTA

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
1	Il muscolo retto superiore è	elevatore, incicloratore, adduttore	elevatore, exciclotortore, adduttore	elevatore, exciclotortore, abducente	extorsore, elevatore, abducente	1
2	Il muscolo obliquo inferiore è	extorsore, elevatore, abducente	abbassatore, exciclotortore	adduttore	intortore, depressore, abducente	1
3	La diplopia fisiologica è	determinata da punti oggetto situati fuori dall'oroptero	determinata da punti oggetto che giacciono nella curva dell'oroptero	presente quando l'immagine viene vista doppia a due cm dal naso	presente quando l'immagine è doppia a 8 cm dal naso	1
4	Il muscolo obliquo superiore ha origine	apice orbitario sopra l'anello di Zinn	dietro la fossa lacrimale	anello di Zinn	nessuna delle precedenti	1
5	Il muscolo obliquo superiore	è il muscolo oculomotore più lungo	è il muscolo oculomotore più corto	è l'unico muscolo la cui origine non è a livello dell'anello di Zinn	nessuna delle precedenti	1
6	Il muscolo elevatore della palpebra superiore ha origine	dietro la fossa lacrimale	anello di Zinn	all'apice orbitario sopra l'anello di Zinn	nessuna delle precedenti	3
7	Le leggi fondamentali che regolano i movimenti oculari sono	La legge di Sherrington della innervazione simultanea	La legge di Sherrington dell'innervazione reciproca	La legge di Hering	Legge di Hering più legge di Sherrington	4
8	Cos' è il MAR?	massimo angolo di risoluzione	minimo angolo di risoluzione	angolo di risoluzione medio	nessuna delle precedenti	2
9	La stereopsi si realizza	attraverso la fusione dei segnali provenienti da elementi retinici disparati in modo orizzontale all'interno dell'area di Panum	attraverso la fusione dei segnali provenienti da elementi retinici disparati in modo verticale all'interno dell'area di Panum	attraverso la fusione dei segnali provenienti da elementi retinici disparati in modo verticale e orizzontale all'interno dell'area di Panum	attraverso la fusione dei segnali provenienti da elementi retinici aventi la stessa localizzazione spaziale sull'oroptero	1
10	Sono anomalie sensoriali	la soppressione	la fissazione eccentrica	la corrispondenza retinica anomala	Tutte le precedenti	4
11	Le tavole a progressione LogMAR	hanno una progressione uguale per ogni riga e pari al logaritmo dell'angolo di minima risoluzione	hanno una progressione delle dimensioni degli stimoli pari all'inverso dell'angolo visuale	non consentono di esprimere piccole variazioni della vista	hanno una progressione che si basa su scala geometrica	1
12	Qual è il potere della cornea?	43 diottrie	40 diottrie	41 diottrie	42 diottrie	1
13	Quale di queste funzioni si avvale della visione binoculare?	la capacità accomodativa	l'acutezza visiva	la stereopsi	il senso luminoso	3
14	Il muscolo ciliare ha sede	nelle palpebre	nell'uvea	nel canale di Schlemm	nella coroide	2
15	L'antagonista controlaterale del muscolo retto superiore destro è	retto superiore sinistro	retto inferiore sinistro	piccolo obliquo sinistro	nessuna delle alternative è valida	3
16	Il muscolo retto mediale è innervato dal nervo	abducente	ottico	oftalmico	oculomotore comune	4
17	I movimenti oculari avvengono	sempre nella stessa direzione	in senso antero-posteriore	contemporaneamente nei due occhi	nessuna delle alternative è valida	3
18	La posizione anomala del capo è un meccanismo compensatore di	confusione	falsa localizzazione delle immagini	diplopia binoculare	confusione, falsa localizzazione delle immagini e diplopia	3
19	Una diottria prismatica è quella di un prisma che fa deviare il raggio incidente di:	1 cm alla distanza di un metro	10 cm alla distanza di un metro	0,1 cm alla distanza di un metro	10 cm alla distanza di 10 metri	1
20	Nel bambino, il punto prossimo, a quale distanza si trova dall'occhio, a circa	8 cm	3 cm	1 cm	20 cm	1
21	La fissazione eccentrica	è un evento binoculare	è associata ad uno strabismo	dipende dalla distanza dell'oggetto	dipende dallo stato accomodativo	2
22	Lo strabismo comporta	un difetto visivo	una patologia dei muscoli intrinseci dell'occhio	una patologia del nervo ottico	un difetto della motilità oculare	4
23	La maggior parte dei bambini alla nascita, sotto il profilo refrattivo, è	miope	ipermetrope	emmetrope	ambiope	2
24	Generalmente il nistagmo è costituito da	due fasi rapide	due fasi lente	un movimento volontario ed uno involontario	una fase rapida ed una lenta	4
25	Il nistagmo è un segno clinico riferito	alle funzioni psichiche	all'apparato locomotore	al sistema visivo	nessuna delle alternative è valida	3
26	Il piano di Listing è	l'asse intorno a cui ruota l'occhio	il piano equatoriale immaginario che passa attraverso il centro di rotazione del bulbo	la distanza tra il punto tangenziale T e il punto I al centro dell'inserzione anatomica del muscolo	nessuna delle alternative è valida	2

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
27	Dopo 5-6 settimane dalla nascita, nel bambino	compaiono le versioni e gli occhi possono compiere dei movimenti coniugati per fissare e seguire un oggetto	i movimenti oculari coniugati divengono precisi e la convergenza è ben sviluppata	si raggiunge la visione binoculare	compaiono i movimenti fusionali, anteposando un prisma di basso potere ad un occhio	1
28	Quando si manifesta un nistagmo dissociato	nei tentativi di sguardo verso l'alto	in caso di oftalmoplegia internucleare nell'abduzione dell'occhio sano	in posizione laterale dello sguardo e nell'inversione della sua direzione quando la persona porta lo sguardo in posizione primaria	Dopo un affaticamento	2
29	I nervi cranici sono	10	8	12	14	3
30	I muscoli extraoculari sono	2	3	4	6	4
31	La prova delle saccadi è un test per valutare il sistema oculomotore e consiste in	un movimento di adattamento degli occhi alla ricerca della migliore messa a fuoco di un oggetto fermo	un movimento veloce degli occhi che ha l'obiettivo di perfezionare la messa a fuoco di un oggetto in un movimento lineare	un movimento lento degli occhi per posizionare nella fovea l'immagine di un oggetto mobile	un movimento rapido degli occhi per posizionare nella fovea l'immagine di un oggetto interessante	4
32	Quale muscolo non origina dall'anello di Zinn	obliquo superiore	obliquo inferiore	retto superiore	retto inferiore	1
33	Da cosa sono uniti i muscoli extraoculari	dalla capsula di Tenone	Dal legamento sospensore	dal legamento d'arresto	dal setto intermuscolare	4
34	Con il termine elemento retinico si indica	il riflesso di fissazione	la direzione visiva principale	l'insieme di strutture del meccanismo retinocerebrale	la linea che unisce la mira con la sua immagine retinica	3
35	Le versioni non comprendono	la retroversione	la levoverione	la supraversione	la convergenza	4
36	Quando si ha uno spostamento del bulbo oculare in avanti rispetto al margine orbitario, lungo un asse sagittale dell'orbita senza dislocazioni laterali, verticali, oblique, si ha un esoftalmo	assiale	eccentrico	assoluto	relativo	1
37	Quale tra le seguenti non è una proprietà ottica delle lenti oftalmiche	ingrandimento	effetto prismatico a base periferica	effetto prismatico a base centrale	asse ottico	4
38	La curvatura anormale della cornea determina	la miopia	l'ipermetropia	L'astigmatismo	nessuna delle alternative è valida	3
39	Le retinocezioni sono	conseguenza dell'oculomozione	conseguenza dell'ammicciamento	conseguenza di reazioni fotochimiche retiniche	conseguenza della riflettività papillare	3
40	La corrispondenza retinica è funzione	monoculare	binoculare	della fissazione eccentrica	monoculare più binoculare	2
41	Sono funzione del muscolo retto laterale	l'abduzione	l'intorsione	l'adduzione	nessuna delle precedenti	1
42	La soppressione elimina	la diplopia	la confusione	il campo visivo in toto	la diplopia e la confusione	4
43	La localizzazione spaziale delle immagini visive dipende	dalla luminosità ambientale scotopica (buio)	dal loro colore	dall'integrazione tra retina e propriocezioni muscolari oculari	dai labirinti	3
44	Le vie oculogire sovrintendono	All'oculomozione volontaria	All'oculomozione sensorio-riflessa	All'oculomozione automatico-riflessa	Tutte le precedenti	4
45	Cosa si trova fra cornea e cristallino?	Una piccola lente biconvessa	Il punto nodale	I fuochi principali	Il diaframma Pupillare	4
46	Il nistagmo è un segno clinico riferito:	All'apparato escretore	Alle funzioni psichiche	Al sistema visivo	All'apparato locomotore	3
47	Il campo davanti e dietro l'oroptero in cui non si verifica la diplopia è noto come	rivalità retinica	isola di Traquair	area di Panum	percezione visiva	3
48	Il riflesso fotomotore è	la risposta pupillare alla stimolazione visiva	la determinazione dell'angolo di Irvine	lo studio della fissazione eccentrica con Visuscope	lo studio dell'angolo irido-corneale	1
49	Sintomo caratteristico della paralisi dell'accomodazione è la	ambliopia	micropsia	macropsia	discromatopsia	2
50	Come viene definito il fenomeno caratterizzato da una elevazione ed exciclotorsione in relazione ad una chiusura forzata degli occhi	fenomeno di Franceschetti	fenomeno del riflesso vestibolo-oculomotore	fenomeno di Bell	fenomeno di Duane	3
51	Il fenomeno di Bell può essere assente o gravemente alterato in caso di	oftalmopatia distiroidea	nistagmo	paralisi del VI nervo cranico	paralisi dell'accomodazione	1

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
52	In seguito al deficit del muscolo retto superiore destro quale posizione anomala del capo può conseguire	testa ruotata a destra, mento elevato, testa inclinata a destra	testa ruotata a sinistra mento elevato, testa inclinata a sinistra	testa ruotata a destra, mento abbassato, testa inclinata a sinistra	testa ruotata a sinistra, mento abbassato, testa inclinata a destra	1
53	Il metodo del gradiente permette di misurare	la convergenza	la convergenza tonica	il rapporto AC/A	la convergenza accomodativa	3
54	Nel complesso della visione per vicino si associano	divergenza, accomodazione, miosi	accomodazione, convergenza, restringimento pupillare	midriasi, convergenza e divergenza	nessuna delle precedenti	2
55	Aniseiconia significa	diversa grandezza delle immagini	distorsione delle immagini	diversa luminosità delle immagini	nessuna delle precedenti	1
56	La deviazione è concomitante quando	è presente la paresi di un muscolo	quando la deviazione è uguale in tutte le posizioni diagnostiche di sguardo	quando la deviazione non è uguale in tutte le posizioni diagnostiche di sguardo	nessuna delle precedenti	2
57	Si ha oftalmoplegia esterna quando	tutti i muscoli extraoculari sono paralizzati	sono paralizzati i muscoli intrinseci	sono paralizzati sia i muscoli intrinseci sia quelli estrinseci	nessuna delle precedenti	1
58	Il diametro antero posteriore medio del bulbo dell'adulto è di circa	18 mm	24 mm	30 mm	35 mm	2
59	Alla nascita la condizione refrattiva normale è una ipermetropia di circa	2-3 diottrie	3-4 diottrie	4-5 diottrie	5-6 diottrie	1
60	L'aniseiconia è quella condizione in cui le immagini che arrivano alla corteccia visiva differiscono	per colore	per grandezza o forma	a causa della anisocoria	nessuna delle precedenti	2
61	L'anisoforia ottica è	una foria intermittente	la differenza tra le due rime palpebrali	una correzione uguale tra i due occhi	quando i due occhi, corretti con potere differente, ottengono la visione binoculare solo mediante un'attività delle vergenze fusionali di entità diversa nelle varie posizioni di sguardo	4
62	Anteponendo un cilindro crociato su un occhio emmetrope	si crea un astigmatismo misto	si crea un astigmatismo ipermetropico	si crea un astigmatismo miopico	si crea un exciclotorsione	1
63	Quale di queste definizioni è esatta	la capsula di Tenone è un rivestimento di tessuto connettivo elastico	ha il ruolo di formare una cavità in cui l'occhio possa muoversi	ha il ruolo di isolare il nervo ottico, l'involucro sclerale e i muscoli dal grasso orbitario	Tutte le precedenti	4
64	L'accomodazione prossimale può essere scatenata	dalla vicinanza apparente di un oggetto	dallo sfuocamento dell'immagine sulla retina	dalla convergenza o divergenza	nessuna delle precedenti	1
65	Il tono accomodativo è	di scarsa entità nei soggetti giovani e nelle ipermetropie	di scarsa entità nei soggetti anziani	ha valori alti nei pazienti miopi	nessuna delle precedenti	2
66	L'ampiezza accomodativa è data dalla	dalla differenza fra il valore diottrico del punto prossimo e del punto remoto	dalla somma del valore diottrico del punto prossimo e del punto remoto	dal prodotto fra il valore diottrico del punto prossimo e punto remoto	nessuna delle precedenti	1
67	Per evocare il Nistagmo Opto-cinetico possiamo utilizzare	allenatore di convergenza di Bangerter	la stecca di filtri rossa	tamburo di Barany	il test dell'occhio di bambola	3
68	In condizioni di massima accomodazione negativa, il cristallino, induce nei raggi luminosi che lo attraversano una vergenza positiva di circa	10 diottrie	20 diottrie	30 diottrie	40 diottrie	2
69	Un normale funzionamento del cristallino presuppone l'esistenza di quale condizione	plasticità del cristallino	normale sviluppo ed efficienza del muscolo ciliare	efficienza dell'arco riflesso	tutte le precedenti	4
70	La C.R.A. si instaura	per eliminare la soppressione	per stimolare aree retiniche corrispondenti	per uno spasmo accomodativo	per eliminare la diplopia	4
71	Il nistagmo oculare si differenzia da quello vestibolare	perché rivela scosse a fase lenta e rapida	perché rivela scosse di tipo pendolare di eguale ampiezza	perché aumenta la frequenza in convergenza	perché diminuisce di frequenza in divergenza	2
72	Una paralisi dell'accomodazione può essere dovuta a	solo botulismo	solo tifo	botulismo e difterite	solo difterite	3

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
73	L'esotropia congenita va differenziata da	pseudostrabismo	esotropia sensoriale	esotropia accomodativa precoce	Tutte le precedenti	4
74	Sindrome A nell'esotropia	massima deviazione in alto e minima in basso	massima divergenza in alto e massima convergenza in basso	la deviazione massima supera di 5 diottrie la deviazione in posizione primaria	nessuna delle precedenti	1
75	Per misurare l'ampiezza delle DVD con il metodo di Bielschowsky occorre	occlusore traslucido e stecca dei filtri rossi	occlusore traslucido	stecca dei filtri rossi	qualsiasi tipo di occlusore	1
76	La manovra della testa di bambola è utile per differenziare	la pseudoparalisi degli abducenti dalla vera paralisi del VI n.c.	la sindrome da blocco del nistagmo	pseudostrabismo	nessuna delle precedenti	1
77	Il torcicollo congenito può essere	solo osseo o osteogeno	solo miogeno	dovuto a problemi di natura neurologica	osseo o osteogeno e miogeno	4
78	Il torcicollo oculare è un atteggiamento compensatore di	diplopia monoculare	diplopia binoculare	confusione	nessuna delle precedenti	2
79	L'ambliopia funzionale è massima se sussiste	fissazione foveale povera	fissazione para-foveale	fissazione extramaculare	assenza di fissazione	4
80	La frattura traumatica del pavimento orbitario può comportare	esoftalmo	visione singola in tutte le posizioni diagnostiche di sguardo	enoftalmo più diplopia nello sguardo in basso	nessuna delle precedenti	3
81	L'ambliopia organica comporta	difetto percettivo del campo visivo centrale	difetto percettivo del campo visivo periferico	perdita della direzione principale	cecità totale	1
82	L'esoftalmo è più frequente	nell'ipotiroidismo	Nel morbo di Addison	Nel morbo di Basedow	Nell'acromegalia	3
83	Il nistagmo oculare è spesso rivelatore di	toxoplasmosi congenita bilaterale	cheratocono uniloculare	coloboma ottico	diabete mellito	1
84	L'ipermetropia favorisce	l'esofovia	l'esoforia	il difetto di convergenza	Tutte le precedenti	2
85	Lo strabismo latente convergente si definisce	iperforia	ipoforia	esoforia	poliopia	3
86	Nelle paralisi del VII nervo cranico, una delle possibili complicanze è	la comparsa di disturbi della coordinazione oculo-motoria	la comparsa di sincinesie patologiche	la comparsa di un deficit della sensibilità	la comparsa di spasmo	2
87	Nella sindrome di Foville	non sono conservati i movimenti di convergenza	i movimenti di convergenza sono conservati	la causa non è mai vascolare	la causa non è mai tumorale	2
88	La Sindrome di Parinaud	consiste in paralisi completa dello sguardo verticale	consiste in paralisi completa dello sguardo orizzontale	in paralisi della divergenza	nessuna delle precedenti	1
89	La paralisi della convergenza	rientra nelle paralisi di sguardo sopranucleare	non interessa i movimenti oculari di vergenza	nella visione lontana i movimenti non sono possibili in tutte le direzioni di sguardo	nella visione vicina c'è la convergenza	1
90	Nella deviazione sghemba	i due occhi sono deviati orizzontalmente	i due occhi sono deviati obliquamente ed in misura simmetrica	i due occhi sono deviati obliquamente ed in misura asimmetrica	il paziente non presenta diplopia	3
91	L'oftalmoplegia internucleare	è un disturbo dello sguardo orizzontale	può presentarsi solo in forma bilaterale	presenta paralisi della convergenza	simula la paresi del retto laterale	1
92	Nella Duane II	è presente limitazione o assenza di abduzione	limitazione o assenza di adduzione	restringimento della fessura palpebrale nel tentativo di abduzione	adduzione normale o lievemente limitata	2
93	Nella Duane I	è presente limitazione dell'adduzione	è presente abduzione normale	è presente restringimento della fessura palpebrale e retrazione in adduzione	nessuna delle precedenti	3
94	Nella sindrome di Brown	l'occhio è incapace di elevarsi quando è in adduzione	l'elevazione risulta alterata in posizione primaria e in abduzione	il test della duzione forzata è negativo	può essere coinvolto solo un occhio	1
95	Il nistagmo	è sempre manifesto	può presentarsi in forma latente o manifesta	in genere è congenito	nessuna delle precedenti	2
96	Alla frattura del pavimento orbitario può seguire	blocco dell'elevazione di tipo restrittivo	blocco dell'abbassamento di tipo restrittivo	blocco dell'elevazione e dell'abbassamento	nessuna delle precedenti	1
97	Nella paralisi del muscolo grande obliquo	testa inclinata e viso ruotato verso il lato paretico, mento alzato	testa inclinata e viso ruotato verso il lato sano, mento abbassato	il paziente non presenta diplopia	nessuna delle precedenti	2
98	Nella paralisi del retto laterale	la diplopia è massima nello sguardo vicino	il viso è ruotato verso il lato dell'occhio non colpito	la diplopia è crociata	la diplopia è maggiore nello sguardo lontano	4
99	L'ambliopia	è un deficit solo unilaterale della vista	è un deficit uni o bilaterale della vista	indica una cecità completa	nessuna delle precedenti	2
100	L'ambliopia può essere	strabica	anisometropica	da deprivazione visiva	Tutte le precedenti	4

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
101	L'esotropia accomodativa può essere	refrattiva (AC/A normale)	non refrattiva (AC/A elevato)	parzialmente accomodativa	Tutte le precedenti	4
102	L'etiologia dell'esotropia non refrattiva	è correlata ad errori refrattivi	è correlata ad una sincinesia anomala tra accomodazione e convergenza accomodativa	è correlata al rapporto AC/A normale	nessuna delle precedenti	2
103	In caso di ipermetropia elevata non corretta e il paziente non accomoda per mettere a fuoco, il rapporto AC/A è	normale	elevato	basso o nullo	nessuna delle precedenti	3
104	L'esotropia essenziale infantile	ha inizio tra la nascita e 6 mesi di età	presenta un grande angolo di deviazione	si può associare a deficit di abduzione	Tutte le precedenti	4
105	Nella microtropia	è presente uno scotoma relativo o scotoma di fissazione sull'occhio deviato	non è presente ambiopia	la CRA è normale	nessuna delle precedenti	1
106	Nella exodeviazione essenziale	l'exodeviazione è almeno 15 diottrie più grande nella fissazione per lontano che in quella per vicino	La deviazione per vicino è almeno 15 diottrie più ampia di quella per lontano	la deviazione per lontano è approssimativamente uguale a quella per vicino	nessuna delle precedenti	3
107	Il past-pointing lo troviamo	nello strabismo paralitico	nelle forie	nello strabismo incomitante	nessuna delle precedenti	1
108	Il torcicollo congenito	L'inizio è raro prima dei 18 mesi	il capo può essere facilmente drizzato	la palpazione del muscolo sternocleidomastoideo risulta negativa	non presenta disturbi visivi	4
109	Un test per differenziare il torcicollo congenito dall'oculare	occludendo un occhio	test di Lang	test delle luci di Worth	test delle 4 diottrie	1
110	Il muscolo meno interessato dalla miopatia endocrina è	il muscolo retto superiore	retto inferiore	retto mediale	retto laterale	4
111	La sindrome dell'occhio pesante è presente nel paziente	affetto da miopia, exotropia, ipertropia	affetto da miopia, esotropia, ipertropia	miopia, esotropia, ipotropia	ipermetropia, esotropia, nistagmo	3
112	Nella paralisi del III nervo cranico completa	è presente ptosi	non è presente ptosi	è presenta miosi	presenta esotropia	1
113	La sindrome mitocondriale di Kearns-Sayre è caratterizzata da	oftalmoplegia esterna progressiva	retinite pigmentosa	ptosi palpebrale	Tutte le precedenti	4
114	In riferimento alla sindrome di Moebius quale di queste definizioni è errata	è caratterizzata dall'impossibilità di abduzione degli occhi oltre la linea mediana	è caratterizzata da paralisi bilaterale centrale del nervo facciale	è presente exotropia	manca dei segni di retrazione	3
115	Nel caso di sclerosi multipla il nistagmo può essere	monoculare	binoculare	sempre asimmetrico	Tutte le precedenti	4
116	Per misurare l'acuità visiva, quale tra i seguenti strumenti NON viene utilizzato?	Anelli di Landolt	Tavole ETDRS	Ottotipo di Pigassau	Tavole di Ishihara	4
117	Il segno pupillare di Argyll-Robertson è segno di	Lue cerebrale	Leucoencefalite	Tumore cerebellare	Meningioma	1
118	Quale è l'indicazione per la prescrizione del bifocale nel bambino	esotropia lontano maggiore di quella vicino	esotropia lontano maggiore di quella vicino	esotropia vicino maggiore di quella lontano	rapporto A /A C elevato	3
119	Nel fenomeno di Marcus-Gunn si verifica un'anomalia dell'occhio in seguito a:	movimento mandibolare	movimento vestibolare	versione destra	nessuna delle precedenti	1
120	E' necessario intervenire tempestivamente sulla ptosi congenita	si	no	se altera la visione e la postura	è indifferente	3
121	Quale, tra le seguenti, è una terapia riabilitativa ortottica	correzione prismatica	perimetria computerizzata	pachimetria	perimetria manuale di Goldmann	1
122	Per eseguire gli esercizi al Sinottoforo è utile anteporre una lente	positiva	negativa	cilindrica	non si può anteporre nessuna lente	2
123	Al Sinottoforo è possibile studiare le torsioni	si	no	solo anteponendo lente cilindrica	solo anteponendo filtro rosso	1
124	La posizione degli occhi al Sinottoforo simula	la visione vicina	la visione lontana	la media distanza	è indifferente	2

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
125	Il lavaggio asettico delle mani è indicato:	Prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con il paziente	Prima di eseguire procedure invasive	Come preparazione alle attività di strumentazione perioperatoria	Al termine delle attività di strumentazione perioperatoria	2
126	La prevenzione primaria ha lo scopo di:	Limitare l'incidenza di una malattia controllando le cause e i fattori di rischio	Guarire i pazienti e ridurre le manifestazioni di malattia mediante una diagnosi e un trattamento precoce	Impedire la diffusione di malattia nei paesi in via di sviluppo	Ridurre il progredire e le complicanze di malattie conclamate	1
127	Nella sperimentazione clinica, il "gruppo di controllo" è il gruppo:	Che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione	Che non riceve il trattamento oggetto di sperimentazione	Incaricato dal Comitato etico di supervisionare la ricerca	Di pazienti che non è stato incluso nel campione	2
128	Per "spettro antibiotico" si intende:	L'insieme degli agenti patogeni sensibili all'azione di un antibiotico	L'insieme degli agenti patogeni resistenti a un determinato antibiotico	Il tempo che l'antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia	L'insieme degli antibiotici capaci di agire nei confronti di un certo patogeno	1
129	Quale dei seguenti fattori non determina una diminuzione del tasso di prevalenza di una malattia?	Riduzione della durata della malattia	Riduzione del tasso di incidenza di una malattia	Emigrazione di casi di malattia al di fuori della popolazione in esame	Emigrazione di persone sane al di fuori della popolazione in esame	4
130	In epidemiologia, gli studi caso-controllo:	Sono spesso utilizzati per indagare cause di malattia	Sono studi longitudinali	Tutte le alternative sono corrette	Includono persone con una determinata malattia (o altra variabile) e un appropriato gruppo di controllo formato da persone non affette dalla stessa malattia	3
131	Il termine di "follow-up" indica:	Un periodo di tempo durante il quale un gruppo di soggetti viene tenuto sotto osservazione	I risultati positivi ottenuti da un intervento sanitario oggetto di analisi	Gli interventi di prevenzione successivi a quelli di prevenzione terziaria	Un intervento terapeutico che gode di grande seguito e fiducia presso la popolazione	1
132	Il tasso di incidenza:	Considera il numero di nuovi eventi in un intervallo t	È una misura epidemiologica istantanea	Si utilizza solo per malattie cronico-degenerative	Nessuna delle risposte è corretta	1
133	Il censimento viene effettuato:	Su un campione della popolazione	Sull'intera popolazione	Sull'unità statistica	Sui caratteri qualitativi della popolazione	2
134	La mediana di un insieme di dati statistici è:	Il dato che ricorre più spesso	Si ottiene ordinando i dati dal più piccolo al più grande e prendendo il valore centrale	La differenza tra il valore massimo e il valore minimo osservati	La semisomma del valore massimo e il valore minimo osservati	2
135	Lo studio di coorte:	Serve per calcolare la prevalenza della malattia considerata	Rappresenta il modello ideale per quantificare il carico di malattia in un preciso momento	È disegnato per calcolare tassi di incidenza e rischio relativo	Nessuna delle risposte è corretta	3
136	Qual è lo scopo della prevenzione primaria	riconoscere precocemente la patologia	ridurre l'incidenza di una patologia	curare complicanze, recidive o invalidità della patologia	tutte le altre risposte sono corrette	2
137	Qual è lo scopo della prevenzione terziaria	curare complicanze, recidive o invalidità della patologia	riconoscere precocemente la patologia	ridurre l'incidenza di una patologia	sanificare gli strumenti	1
138	Quale tra questi trattamenti non riabilita l'ambliopia	press-on prismatico	Press-on sf. +3.00	Filtro di Bangerter	Filtro rosso	1
139	Nella scala di gradazione del filtro di Bangerter quale non è esistente	0.1	1.0	0.5	0.3	3
140	I settori binasali sono utili nel trattamento	dell'esotropia congenita di tipo crociato	dell'exotropia	nell'ambliopia bilaterale	nella limitazione dell'adduzione	1
141	L'allenatore di Bangerter si utilizza nel trattamento del	iperforia	esoforia	deficit di convergenza	deficit della divergenza	3
142	Nel caso di esotropia monolaterale il bendaggio si utilizza	per rimuovere l'ambliopia	per stabilizzare la fissazione	per ottenere l'alternanza	tutte le precedenti	4
143	Nel trattamento dell'ambliopia, la penalizzazione con il +3 sfera dell'occhio sano è utile	solo per vicino	solo per lontano	per vicino e per lontano	non si utilizza	2
144	Le esercitazioni di ipovisione dovrebbero essere condotte	da un ortottista	da un oculista	da uno psicologo	da una équipe	4
145	Su quale principio si basano gli ausili ottici	di ingrandire l'immagine	di spostare l'immagine	di stimolare il minor numero di fotorecettori retinici	nessuna delle precedenti	1

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
146	L'impiego di mezzi ingrandenti comporta una distanza di lettura	più corta del normale	normale	più lunga del normale	nessuna delle precedenti	1
147	La lampada del leggio dovrebbe essere	non a luce uniforme	a sorgente puntiforme	posizionata in alto	nessuna delle precedenti	2
148	La legge 138/2001 classifica l'ipovedente grave tra coloro che	hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%	hanno un residuo visivo non superiore a 1/20	hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore	hanno un residuo visivo non superiore a 2/10	3
149	L'ipovisione periferica	non compromette la velocità di lettura	non permette di vedere l'oggetto che si sta fissando	è la condizione più frequente di ipovisione	compromette la velocità di lettura	4
150	Tra le formule per determinare l'ingrandimento teorico la più utilizzata è	ingrandimento teorico=acuità visiva riscontrata/acuità visiva auspicabile	ingrandimento teorico=acuità visiva auspicabile/acuità visiva riscontrata	ingrandimento teorico=acuità visiva auspicabile/acuità visiva riscontrata	ingrandimento teorico=acuità visiva auspicabile-acuità visiva riscontrata	2
151	Quale visus permette di leggere i caratteri della stampa?	1 10	2 10	3 10	4 10	4
152	Il test di Amsler a 30 cm ci permette di indagare il campo visivo	nei 40 gradi centrali	nei 20 gradi centrali	nei 35 gradi centrali	nei 30 gradi centrali	2
153	Il TRL è	localizzazione retinica riabilitata	area retinica preferenziale	area retinica da riabilitare	nessuna delle precedenti	1
154	La localizzazione del PRL si può ottenere con il test di	Maddox	Amsler	Hess-Lancaster	nessuna delle precedenti	2
155	Gli esami per valutare il PRL sono	monoculari	binoculari	è indifferente	nessuna delle precedenti	1
156	I filtri selettivi possono migliorare	la sensibilità al contrasto	la diplopia	la soppressione	nessuna delle precedenti	1
157	Un soggetto normale ha una velocità di lettura compresa tra	100 e 500 parole al minuto	200 e 400 parole al minuto	400 e 500 parole al minuto	200 e 600 parole al minuto	2
158	Maggiore è l'ingrandimento ottico	maggiore è la distanza dal testo di lettura	aumenta la profondità di fuoco	aumenta il campo di visione	minore è la distanza dal testo di lettura	4
159	Il paziente ipovedente deve leggere	seguendo la riga con la testa	facendo scorrere il testo davanti agli occhi senza muovere la testa	spostando lo sguardo da destra a sinistra	spostando lo sguardo da sinistra a destra	2
160	L'ingrandimento 1X equivale a	+5 diottrie	+3 diottrie	+4 diottrie	+6 diottrie	3
161	La soppressione si può trattare quando c'è	una CRA	una CRN	quando il paziente non è capace di fondere	nessuna delle precedenti	2
162	Il metodo della caccia si effettua con	filtro rosso	stecca dei filtri rossi	due penne	sinottoforo	4
163	Il metodo di Duane misura	il punto prossimo di convergenza	il punto prossimo di accomodazione	la rottura del punto prossimo di convergenza	il recupero del punto prossimo di convergenza	2
164	Il metodo di Duane è meglio eseguirlo in	monoculare	binoculare	senza la correzione ottica	nessuna delle precedenti	1
165	La sindrome di Hill è una sindrome	con deficit della convergenza	da sforzo accomodativo	con pseudodeficit accomodativo	che migliora con lente negativa	2
166	A cosa serve il test di Cohen	per valutare la diplopia	per valutare il PRL	per valutare la CRA	per valutare le alterazioni del senso cromatico	2
167	Se un paziente percepisce in un occhio la luce e nel controlaterale conta le dita a 30 cm è	cieco totale	cieco parziale	ipovedente grave	ipovedente lieve	2
168	Coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi o che hanno la mera percezione dell'ombra, della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore	ciechi totali	ciechi parziali	ipovedenti gravi	ipovedenti medio-gravi	1
169	I pazienti in cui il residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3% sono classificati	ipovedenti medio gravi	ipovedenti gravi	ciechi parziali	ciechi totali	4
170	In ipovisione quale di queste modalità rientra nel programma riabilitativo	riabilitazione visiva	riabilitazione psico-visiva	riabilitazione psicomotoria	tutte le precedenti	4
171	I software Cogpeck, Lightning, Catchme sono utilizzati	nella disabilità visiva e motoria	nel glaucoma	nella retinopatia diabetica	nessuna delle precedenti	1
172	Una ipovisione centrale determina	scotomi paracentrali	metamorfopsie	adattamento al buio lento	nessuna delle precedenti	2

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
173	Il sistema prismatico si può usare come sistema ingrandente quando	l'acutezza visiva è simile nei due occhi	quando almeno un occhio riesce ad elevare il visus per la lettura	strettamente per la visione lontana	nessuna delle precedenti	1
174	I sistemi telescopici vengono adottati	solo nella visione lontana	solo nella visione vicina	solo monocolarmente	sia per la visione vicina che lontana	4
175	Il sistema telescopico galileiano	è pesante, ingombrante ed antiestetico	non riduce il campo visivo	non si può adattare alla visione vicina	è costituito da un obiettivo\lente positiva e da un oculare\lente negativa	4
176	L'ipovisione periferica determina	alterazione della soglia di sensibilità retinica del campo visivo centrale	riduzione dell'acuità visiva centrale e della sensibilità al contrasto	adattamento al buio lento	adattamento alla luce allungato	3
177	Il sistema telescopico kepleriano	ha un ingrandimento massimo raggiungibile di 4X	ha un ingrandimento che varia da 2,5X a 15X	è meno ingombrante del sistema galileiano	ha l'obiettivo e l'oculare con lente negativa	2
178	Gli ausili elettronici	sono software di ingrandimento del testo	sono videoingranditori o CCTV	sono economici	hanno un ingrandimento fino a 4X	2
179	Le lenti filtranti e mediche sono classificate come	ausili ottici	ausili elettronici	ausili informatici	ausili posturali	1
180	Le lenti aplanatiche	sono composte da due lenti negativa e positiva	sono composte da due lenti positive di uguale potere diottrico	sono utilizzabili solo binocularmente	sono utilizzabili sia binocularmente che monocolarmente	2
181	Le lenti ipercorrettive	sono una buona soluzione per la visione lontana	sono una buona soluzione per la visione vicina	sono una buona soluzione sia per la visione vicina che lontana	nessuna delle precedenti	2
182	Le lenti ipercorrettive possono essere	monoculari e binoculari	solo monoculari	solo binoculari	nessuna delle precedenti	1
183	La prevenzione secondaria ha lo scopo di	limitare l'incidenza di una malattia controllando le cause e i fattori di rischio	Guarire i pazienti e ridurre le manifestazioni di malattia mediante una diagnosi e un trattamento precoce	Impedire la diffusione di malattia nei paesi in via di sviluppo	Ridurre il progredire e le complicanze di malattie conclamate	2
184	La prevenzione terziaria ha lo scopo di	limitare l'incidenza di una malattia controllando le cause e i fattori di rischio	Guarire i pazienti e ridurre le manifestazioni di malattia mediante una diagnosi e un trattamento precoce	Impedire la diffusione di malattia nei paesi in via di sviluppo	Ridurre il progredire e le complicanze di malattie conclamate	3
185	Lo screening fa riferimento alla prevenzione	primaria	secondaria	terziaria	nessuna delle precedenti	2
186	La riabilitazione fa riferimento alla prevenzione	primaria	secondaria	terziaria	nessuna delle precedenti	3
187	Quanti livelli di prevenzione possono essere definiti	2	3	4	5	2
188	Il test di screening	è un esame che consente di individuare in fase iniziale una certa malattia	è un esame che consente di individuare in fase finale una certa malattia	è un esame che consente di individuare la predisposizione a una certa malattia	è un esame che classifica tutte le patologie presenti in un soggetto	1
189	In caso di PAC con testa ruotata a destra, mento abbassato, testa inclinata a destra, quale muscolo oculare è compromesso	muscolo grande obliquo sinistro	muscolo grande obliquo destro	muscolo piccolo obliquo destro	muscolo piccolo obliquo sinistro	1
190	Le valutazioni da eseguire nell'esame della motilità sono	duzioni	versioni	vergenze	Tutte le precedenti	4
191	Cosa indica l'indice di Arden?	il valore del PEV	il valore del PERG	il valore dell'ERG	il valore dell'EOG	4
192	Le risposte fotopiche e scotopiche si studiano nel	PEV da Pattern	Pev da flash	nell'ERG	nell'EOG	3
193	Per quali patologie sono indicati gli EOG	nella diagnosi differenziale tra il melanoma maligno della coroide ed il nevo della coroide	nella retinite pigmentosa	nella sclerosi multipla	nessuna delle precedenti	1
194	Gli ERG sono indicatori	retinite pigmentosa	distacco di retina	trombosi VCR	tutte le precedenti	4
195	La sindrome di Moebius è caratterizzata da una paralisi totale o parziale	del VI e VII nervo cranico	del VI e IV nervo cranico	del III e VII nervo cranico	del VI e III nervo cranico	1
196	Eseguendo la schiascopia l'ombra può verificare una delle seguenti possibilità	ombra diretta	ombra inversa	nessuna ombra	Tutte le precedenti	4
197	In quale caso si usa il test di Gracis	nella diplopia	nella microtropia	nell'eccesso della divergenza	per valutare le saccadi	2

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
198	Qual è il test alternativo alla ciclopegia per annullare l'accomodazione	test del bilanciamento	test dell'annebbiamento	test dei cilindri crociati	test del filtro rosso	2
199	L'astigmatismo è definito fisiologico	quando le mire dell'oftalmometro si accavallano di mezzo gradino	quando le mire dell'oftalmometro restano tangenti	quando le mire appaiono sovrapposte	quando le mire appaiono distanziate	1
200	Quando l'astigmatismo si dice obliquo	quando k1 e k2 si trovano fra 30° e 60° e tra 120° e 150°	Quando k1 e k2 si trovano tra 90° e 180°	quando k1 e k2 sono perpendicolari	nessuna delle precedenti	1
201	Quando l'astigmatismo si definisce contro regola	quando le mire dell'oftalmometro sono più distanziate tra loro	quando le mire dell'oftalmometro restano tangenti	quando le mire dell'oftalmometro si sovrappongono	Quando le mire dell'oftalmometro appaiono di dimensioni diverse	1
202	L'oftalmometria è utile nella diagnosi	di cheratocono in fase conclamata	astigmatismo irregolare	astigmatismo obliquo	tutte le precedenti	4
203	Un occhio ametropo può essere	un occhio più lungo del normale	un occhio che non distingue i colori	un occhio con lunghezza normale	nessuna delle precedenti	1
204	Qual è la distanza più comunemente usata per eseguire la schiascopia?	66 cm	100 cm	150 cm	40 cm	1
205	Quale stecca per schiascopia usi quando l'ombra è diretta	stecca di lenti positive	stecca di lenti negative	stecca di lenti cilindriche	nessuna delle precedenti	1
206	Il test duocromatico	serve per valutare le alterazioni dei colori sull'asse rosso-verde	è utile nella diagnosi differenziale del daltonismo	è utile per bilanciare binocularmente la correzione	è utile per il bilanciamento monoculare della correzione	4
207	Il foro stenopeico	è utile per rendere più precisa la correzione cilindrica	serve per bilanciare la correzione	riduce i cerchi di diffusione	migliora la visione di un occhio con un problema organico	3
208	Il test di Duane	aiuta a misurare la deviazione nella Sindrome di Duane	aiuta a valutare il visus lontano	è utile per la determinazione dell'ampiezza accomodativa	nessuna delle precedenti	3
209	L'ERG da Flash scotopico studia	Bastoncelli (onda B)	Coni (onda A)	Retina interna	Complesso EPR	2
210	L'esame delle duzioni si esegue	esaminando un occhio alla volta essendo l'altro occluso. Il paziente deve muovere la testa e seguire la mira nelle 9 posizioni di sguardo	con entrambi gli occhi aperti. Testa dritta e immobile e il paziente deve seguire la mira nelle nove posizioni	si esegue esaminando un occhio alla volta essendo l'altro occluso. Il paziente deve tenere testa dritta e ferma e seguire il movimento della mira	nessuna delle precedenti	3
211	La SWAP è	un test di screening	perimetria blu su giallo	un approfondimento del G.P.A	metodica per trovare area cecale	2
212	I vetri striati di Bagolini, come vengono posizionati per poter eseguire correttamente il test?	Perpendicolari tra loro	90°OD e 180° OS	135° OD e 45° OS	paralleli tra loro	3
213	Il test di Pelli-Robson studia	la stereopsi	il visus per vicino	la sensibilità al contrasto	la microtropia	3
214	Per lo studio del senso cromatico dei bambini più piccoli si usano le	lane di Holmgreen	lane di Bangerter	lane di Bagolini	lane di Pfeiffer	1
215	La macropsia monoculare ha come conseguenza, dal punto di vista binoculare	perdita di corrispondenza biretinica	soppressione ed ambliopia dell'occhio in causa	difficoltà di fusione binoculare	nessuna delle precedenti	3
216	L'onda B dell'elettroretinogramma è originata da	Epitelio pigmentato	Coni	Bastoncelli	Cellule di Muller	4
217	La trisomia 21 è caratterizzata da	ipertelorismo	rime palpebrali oblique o arcuate	epicanto	Tutte le precedenti	4
218	La maggior parte dei bambini, alla nascita, è	ipermetrope	miope	emmetrope	astigmatico	1
219	L'emeralopia si accentua funzionalmente	in pieno giorno	al crepuscolo e nella notte	di mattina	nessuna delle precedenti	2
220	Strato più interno della coroide a diretto contatto con l'epitelio pigmentato retinico	membrana di Bowman	membrana di Bruch	membrana di Descemet	membrana epiretinica	2
221	L'endotelio corneale da quanti strati è costituito	uno	due	tre	quattro	1
222	Quale tra i seguenti strumenti viene adoperato per l'esplorazione del senso cromatico	Amblioscopio	Anomaloscopio di Nagel	Retinoscopio	nessuna delle precedenti	2

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
223	Il disco di Placido è uno strumento atto a	Verificare la regolarità della curvatura corneale	determinare l'entità del vizio di refrazione	individuare l'occhio dominante	valutare il grado di binocularità	1
224	L'ipermetropia comporta sforzo visivo	solo per lontano	solo per vicino	per lontano e vicino	a luminanza elevata	3
225	La classificazione di McCallan del tracoma	Si divide in IV stadi	prevede tre categorie distinte	prevede 2 stadi maggiori e tre minori	nessuna delle precedenti	1
226	Quale delle seguenti ossa non contribuisce alla formazione dell'orbita	osso nasale	osso etmoidale	osso frontale	osso sfenoide	1
227	Il tonometro ad indentazione	può darci valori errati se vi è cataratta	può darci valori errati in caso di rigidità sclerale alterata	può darci valori alterati in caso di glaucoma terminale	nessuna delle precedenti	2
228	L'iridectomia periferica è	chirurgica	congenita	effettuata per favorire il deflusso del vitreo	nessuna delle precedenti	1
229	In quale tra le seguenti affezioni il tenore in MPS delle lacrime è più elevato che di norma	Sindrome di Steven Johnson	Sindrome di Sjogren	Sindrome di Parinaud	Sindrome di Reiter	2
230	La diagnosi differenziale tra papilla da stasi e papillite si basa	sull'edema retinico	sull'acutezza visiva e sulle alterazioni elettroretinografiche	sul test dei colori	nessuna delle precedenti	2
231	Indicare la manifestazione oculare più frequente in corso di AIDS	emorragia retinica	essudato cotonoso	essudato duro	uveite	2
232	La presbiopia è affezione propria	dell'infanzia	dell'adolescenza	della senilità	nessuna delle precedenti	3
233	Quali delle seguenti malattie infettive può essere causa di retinite pseudo pigmentosa	toxoplasmosi	morbillo	candidosi	brucellosi	2
234	Una riduzione del tono oculare può essere dovuta a	iridociclite	distacco di coroide	perforazione della cornea	Tutte le precedenti	4
235	Nell'afachia chirurgica può esserci	la pupilla intensamente nera	l'aumento di profondità della camera anteriore	l'assenza delle immagini lenticolari di Purkinje	Tutte le precedenti	4
236	Il secondo punto nodale dell'occhio	è sito vicino alla macula	è il centro di rotazione dell'occhio	è sito in vicinanza del polo posteriore del cristallino	nessuna delle precedenti	3
237	L'edema maculare cistoide afachico è altresì noto come	sindrome di Irvine-Gass	Sindrome di Coats	malattia di Stargardt	nessuna delle precedenti	1
238	L'emianopsia doppia causata da una lesione retrogenicolata si accompagna a	normoreflettività pupillare alla luce	a percezione di buio totale	ad oculomozione alterata	nessuna delle precedenti	1
239	Con il termine deuteranopia si definisce	l'alterazione della visione dei colori sull'asse rosso-verde	l'alterazione della visione dei colori sull'asse giallo-blu	la visione notturna	la visione diurna	1
240	Nell'esame biomicroscopico della cornea con la tecnica della retroilluminazione, il piano di riflessione del fascio luminoso è situato a livello del	Cristallino	Vitreo	Retina	Iride	4
241	Nel cheratocono compare	astigmatismo irregolare	astigmatismo regolare	astigmatismo misto	nessuna delle precedenti	1
242	Quale delle seguenti affezioni non è contraddistinta dal reperto di essudati cotonosi	anemia	vasculiti sistemiche	retinopatia da altitudine	retinopatia del prematuro	4
243	La blefarocalasi è un'affezione	cutaneo-palpebrale	dei muscoli tarsali	del muscolo orbicolare palpebrale	palpebro-congiuntivale	1
244	In quale periodo della gestazione la rosolia può provocare l'insorgenza di cataratta	nella prima settimana	dalla seconda alla decima settimana	dalla quindicesima alla trentesima settimana	dalla decima alla quindicesima settimana	2
245	Quale dei seguenti esami dà più precocemente risultati alterati nella degenerazione maculare vitelliforme	elettroretinogramma	elettrooculogramma	misura del senso cromatico	misura dei potenziali visivi evocati	2
246	L'atropina farmacologicamente è	parasimpaticomimetico	parasimpaticolitico	simpaticomimetico	parasimpaticomimetico e simpaticolitico insieme	2
247	La causa più frequente di glaucoma neovascolare è	l'ipertono	l'ischemia retinica	l'ischemia iridea	l'ischemia coroideale	2

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
248	L'emeralopia essenziale è un'affezione su basi	geniche eredo-familiari	tossico-iatrogene	dismetaboliche	infettive	1
249	Qual è la complicanza più frequente della fossetta colobomatosa del disco ottico	distacco sieroso del neuroepitelio	distacco regmatogeno	distacco di coroide	neuropatia ottica	1
250	La presbiopia raggiunge il suo apice all'età di	40 anni	45 anni	50 anni	60 anni	4
251	Il test di Farnsworth serve per esplorare le turbe del senso cromatico	principalmente sull'asse rosso-verde	principalmente sull'asse giallo-blu	su tutti gli assi	sotto luminanza mesopica	3
252	Quale delle seguenti affermazioni non è vera nel glaucoma pigmentario	apposizione o adesione dell'iride al trabecolato	forma di glaucoma ad angolo aperto	alterazioni dell'epitelio pigmentato irideo	importante accumulo di pigmento nella trama del trabecolato	1
253	Il cartoncino con disegnata una griglia che viene usato nella valutazione di deficit o di distorsioni del campo visivo centrale è il :	test di Amsler	Test di Hess	Test di Lancaster	test di Snellen	1
254	Nei portatori di lenti corneali la principale causa di edema corneale è	l'anossia	l'iperglicemia	l'ipoglicemia	l'ipercorezione	1
255	Tra le seguenti caratteristiche di cataratta una non è corretta	cataratta nucleare	cataratta corticale	cataratta intumescente	cataratta pigmentata	4
256	Il punto di passaggio tra retina visiva e retina cieca è definito<<ora serrata>>;a questo livello la retina:	subisce un assottigliamento	mantiene invariato il suo spessore	subisce un ispessimento	nessuna delle precedenti	1
257	In pazienti con una neurite ottica acuta, quale delle seguenti affermazioni è corretta	normale l'aspetto della papilla ottica	normale la risposta pupillare alla luce	normali i pev	normale la visione dei colori	1
258	A livello retinico i coni sono localizzati prevalentemente	all'estrema periferia	a livello maculare	su tutto l'ambito retinico, macula esclusa	nessuna delle precedenti	2
259	La sindrome della loggia cavernosa comprende	miosi-ptosi-enoftalmo-paralisi del VII-nistagmo	miosi-ptosi-enoftalmo-paralisi del VI-sintomatologia trigeminale	miosi-ptosi-enoftalmo-paralisi del VII-emisindrome cerebellare	miosi-ptosi-enoftalmo-paralisi del VI-emisindrome cerebellare	2
260	Un' assenza di flogosi del segmento anteriore, la lacrimazione riflessa, il blefarospasmo e la fotofobia sono segni di	glaucoma cronico semplice	megalocornea	glaucoma congenito	cheratocono	3
261	L'effetto prismatico di lenti sferiche è dovuto a	decentramento della lente	differenza dell'indice di rifrazione	differente velocità della luce tra l'aria e la lente	nessuna delle precedenti	1
262	La cheratite puntata può essere causata da	glaucoma	herpes simplex	herpes zoster	nessuna delle precedenti	2
263	Qual è la metodica più attendibile per la diagnosi dell'emangioma cavernoso della coroide, a diottri trasparenti	angiografia retica a fluorescenza	l'angiografia ad indocianina verde	l'ecografia	la transilluminazione	2
264	In caso di attacco di glaucoma si usano	pilocarpina	inibitori dell'anidraasi carbonica	beta-bloccanti	Tutte le precedenti	4
265	Un fascio di raggi luminosi che convergono su un punto ha, alla distanza di un metro dal fuoco, una vergenza positiva di :	+ 1 diottria	+0,1 diottria	+10 diottrie	+5 diottrie	1
266	Il corpo vitreo è composto:	Da acido ialuronico	per la maggior parte da acqua	da collagene	Tutte le precedenti	4
267	La sindrome di Sjogren:	non si associa mai ad una artrite reumatoide	induce una cheratocongiuntivite secca	induce una cheratite disciforme	nessuna delle precedenti	2
268	Un miope di 2 diottrie, non corretto, ha un punto remoto a	1 m	25 cm	2,5 m	50 cm	4
269	La camera anteriore è occupata normalmente:	da siero	da vitreo	da siero e da vitreo	da umore acqueo	4

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
270	La metamorfopsia visualizzata con il test di Amsler è compatibile con	distacco dell'epitelio pigmentato retinico sieroso coinvolgente la regione maculare	distacco semiemorragico della retina neurosensoriale coinvolgente la regione maculare	edema maculare cistoide	tutte le precedenti	4
271	Cataratta, vitreo iperplastico persistente primitivo e coloboma sono caratteri che si trovano nell'80% dei casi di:	trisomia 18	trisomia 13	trisomia 21	diabete materno	2
272	Nell'attacco acuto di glaucoma è presente	iperemia pericheratica	iperemia congiuntivale a settore	iperemia congiuntivale epibulbare	iperemia parossistica	1
273	Lo xantelasma si riscontra	nella congiuntiva	nella cornea	nella cute palpebrale	nella sclera	3
274	Nella contrazione del muscolo ciliare	le fibre della zonula sono più tese	le fibre della zonula sono più rilasciate	il raggio di curvatura della superficie del cristallino è più grande	nessuna delle precedenti	2
275	L'agente eziologico per eccellenza dell'orzaiolo è	streptococco	neisseria	stafilococco	adenovirus	3
276	Nella ptosi palpebrale paralitica è implicato	il muscolo retto superiore	il muscolo orbicolare delle palpebre	il muscolo elevatore della palpebra superiore	il muscolo tarsale superiore	3
277	L'immagine virtuale formata da una lente convessa è	rovesciata, ingrandita	diritta e ingrandita	diritta e rimpicciolita	diritta e di grandezza invariata	2
278	Nella fase acuta del papilledema	Sono presenti edema e congestione vascolare della testa del nervo ottico	La foveola fisiologica viene obliterata	si possono evidenziare emorragie del nervo ottico	Tutte le precedenti	4
279	Qual è il sito bersaglio elettivo della retinopatia rubeolica	cellule ganglionari	cellule bipolari	capillari sanguigni	epitelio pigmentato	4
280	In quale affezione il campo visivo evidenzia gli scotomi arciformi di Bjerrum	retinite pigmentosa	glaucoma cronico primario	atrofia ottica dominante	papillite	2
281	Le stecche da schiasopia contengono	lenti positive	lenti negative	lenti prismatiche	lenti positive e lenti negative	4
282	Quale delle seguenti affermazioni a proposito del pucker maculare non è corretta	è una membrana fibrocellulare avascolare che prolifera sulla superficie retinica interna	crea trazione tangenziale sulla macula	causa perdita della visione centrale con o senza metamorfopsie	è caratterizzato da emorragie sottoretiniche	4
283	La neurite ottica retrobulbare implica generalmente	caduta del visus centrale	amaurosi	restringimento concentrico del campo visivo	nessuna delle precedenti	1
284	Quale di queste condizioni non è causa di cheratite da esposizione	morbo di Basedow	coma	cheratocono	spasmo dell'elevatore della palpebra superiore	3
285	Un miope di 5 diottrie, corretto, ha il punto remoto a	2,5 m	2 m	50 cm	infinito	4
286	Un fascio di raggi luminosi divergenti ad una distanza di 33 cm dalle sue origini ha una vergenza negativa di	meno 3 diottrie	meno 0.3 diottrie	meno 2 diottrie	meno 0.2 diottrie	1
287	Nei casi iniziali di glaucoma cronico semplice come prova da carico viene utilizzata	acqua	alchool	derivati della marijuana	farmaci osmotici	1
288	L'atropina sulle strutture oculari ha un effetto	midriatico	ciclopegico	midriatico+ciclopegico	miolitico+ciclopegico	3
289	Nel glaucoma congenito abbiamo	buftalmo	criptoftalmo	bulbo normale	microftalmo	1
290	L' iridectomia periferica antiglaucomatosa è indicata nel	glaucoma congenito	glaucoma cronico primario	glaucoma ad angolo stretto	glaucoma secondario	3
291	Quali sono le complicanze della retinopatia diabetica	solo le trombosi venose retiniche	solo il glaucoma	solo la retinopatia proliferante	la trombosi venosa retinica, il glaucoma e la retinopatia proliferante	4
292	Cosa inducono nell'occhio glaucomatoso le prostaglandine	aumento della pressione	midriasi	diplopia	diminuzione della pressione	4

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
293	La schiascopia è una metodica volta a	osservare il fondo oculare	effettuare un esame obiettivo del grado di refrazione	rilevare opacità dei mezzi diottrici	effettuare un esame del circolo venoso retinico	2
294	Il test di schirmer si usa in caso	ittiosi	diabete	sindrome dell'occhio secco	morbo di Graves	3
295	Qual è la causa più frequente di ipermetropia	Bulbo oculare più corto della norma	diabete mellito	cheratocono	trapianto di cornea	1
296	L'atropina provoca	poliopia	miosi e iposecrezione lacrimale	eteroforia	midriasi e paralisi dell'accomodazione visiva	4
297	Nella degenerazione maculare senile il visus di solito è	ridotto	conservato	deformato	ridotto e deformato	4
298	Le miodesopsie il più delle volte sono conseguenti a	fluidificazione e deterioramento del corpo vitreo bilaterale	opacità lenticolari	tyndall in camera anteriore	abrasioni corneali	1
299	Col termine deuteranopia si definisce	l'alterazione della visione del colore verde	l'alterazione della visione dei colori sull'asse giallo-blu	la visione notturna	la visione diurna	1
300	Quale delle seguenti è una causa dell'occhio secco	La miopia	La sindrome di Sjogren	L'astigmatismo	La retinite pigmentosa	2
301	Quale tecnica di imaging è preferibile per lo studio dell'atrofia geografica della DMLE secca	Autofluorescenza	Fluorangiografia	Angiografia al verde di indocianina	OCT	1
302	Quale delle seguenti non è una forma di glaucoma	primario ad angolo aperto	secondario	daltonico	A bassa pressione	3
303	La congiuntivite giganto-papillare è spesso causata da	batteri	Adenovirus	elevata secchezza dell'occhio	utilizzo di LAC	4
304	La corioretinopatia sierosa centrale è una malattia dovuta a	versamento di liquido tra gli stati retinici	esposizione ad allergeni	miopia elevata	diabete mellito	1
305	Quali esami sono utili nella diagnosi di DMLE essudativa	Campo visivo	Fluorangiografia al verde di indocianina	HRT	Tutte le precedenti	2
306	Nello screening della DMLE qual è l'esame più indicativo	Esame del visus	Test di Amsler	microscopia confocale	ecografia	2
307	Che cos'è la distrofia di Fuchs	Degenerazione dell'epitelio corneale	degenerazione stromale	Degenerazione dell'endotelio corneale	Distrofia corneale	3
308	Quale dei seguenti ciclopegici è più tossico	Omatropina	ciclopentolato	Atropina	Tropicamide	3
309	Qual è il processo degenerativo caratterizzato da piccoli depositi di calcio opachi nel vitreo?	Sindrome dell'interfaccia vitreo-retinica	Vitreite	Uveite	lalosi asteroide	4
310	L'uso protratto di farmaci fenotiazinici può comportare	neurite ottica retrobulbare	retinopatia	papilledema	cataratta	2
311	L'anomalia caratterizzata da un alterato orientamento delle ciglia prende il nome di	trichiasi	distichiasi	ptosi	sindrome di Stevens-Johnson	1
312	Quale dei seguenti difetti della vista si può correggere mediante la chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri	miopia	astigmatismo	ipermetropia	tutte le precedenti	3
313	Quale delle seguenti non è una causa di nistagmo oculare	Occhio pigro	Distrofia retinica	miopia	Glaucoma bilaterale	3
314	Il test di Farnsworth serve per esplorare le turbe del senso cromatico	sull'asse rosso-verde	sull'asse giallo-blu	sotto luminanza fotonica	su tutti gli assi	4
315	Nel glaucoma cronico semplice il primo danno campimetrico è costituito da	Emianopsia	Quadrantopsia	Aumento delle macchie cieche	Scotoma centrale relativo	3
316	La Novesina è	un anestetico locale da infiltrazione	un anestetico locale da contatto	un anestetico generale	un antibiotico	2

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
317	La vascolarizzazione dell'occhio dipende dalla:	retina	palpebra	arteria oftalmica	aorta	3
318	I colliri hanno un pH generalmente compreso	tra 7,4 e 7,7	tra 3,5 e 5,0	tra 4,6 e 6,8	tra 2,5 e 3,8	1
319	La presenza di eosinofili nel secreto congiuntivale depone per	congiuntivite virale	congiuntivite batterica	congiuntivite discrasica	congiuntivite primaverile	4
320	La sindrome di Sjogren	si associa spesso ad artrite reumatoide	induce una cheratocongiuntivite secca	induce una cheratite disciforme	si associa sia ad artrite reumatoide che a cheratocongiuntivite secca	4
321	L'abolizione del riflesso fotomotore diretta con persistenza del riflesso miosi-accomodazione-convergenza va sotto il nome di:	Segno di di Behr	segno di Argyll-Robertson invertito	segno di Argyll-Robertson	segno di pseudo Argyll-Robertson	3
322	In quanti stadi viene classificata la retinopatia ipertensiva	3 stadi	5 stadi	4 stadi	8 stadi	3
323	Nell'ambito della retinopatia ipertensiva, quale segno preclude spesso all'occlusione vasale?	Il segno di pretrombosi di Bonnet	Il segno di Gunn	Il segno di ingorgo	Il riflesso assiale a filo di rame	1
324	La causa più frequente del glaucoma neovascolare è	l'ipertono	l'ischemia retinica	l'ischemia iridea	l'ischemia coroideale	2
325	L'edema maculare cistoide afachico è noto come:	sindrome di Coats	maculopatia di Best	sindromedi Irvine-Gass	nessuna delle alternative è valida	3
326	Le stecche da schiascopia	si possono usare solo in midriasi	permettono di misurare oggettivamente la refrazione	permettono di misurare soggettivamente la refrazione	non sono di aiuto per valutare la refrazione dei bambini	2
327	Lo strato più interno della coroide a contatto con l'epitelio pigmentato retinico è la membrana:	di Bowman	di Bruch	di Descemet	epiretinica	2
328	L'elettroretinogramma è estinto	nell'atrofia ottica	nelle degenerazioni maculari	nelle degenerazioni tappeto-retiniche	sia nell'atrofia ottica che nelle emianopsie	3
329	La sottile zona che divide la cornea dalla sclera prende il nome di:	corpo ciliare	coroide	limbo	membrana di Bruch	3
330	Come si definisce il distacco di retina quando ha origine dalla rottura della stessa	Trazionale	Essudativo	Regmatogeno	Distacco a forme miste	3
331	La pinguecola è un processo degenerativo a carico di	Sclera	Iride	Palpebra	Congiuntiva	4
332	Cataratta vitreo iperplastico persistente primitivo e coloboma sono caratteri che si trovano nell'80% nei casi di	trisomia 18	trisomia 21	sindrome di Turner	trisomia 13	4
333	Il prelievo di cornea non è possibile	Portatore di carcinoma epatico	Portatore di leucemia linfatica	Paziente con grave miopia	bambino al di sotto dei 10 anni	2
334	Individuare quale tra le seguenti condizioni non causa diplopia	disturbi muscolari	disturbi neurologici	distacco di retina	intossicazione acuta da alcool	3
335	Quale delle seguenti patologie colpisce quasi esclusivamente neonati prematuri	ROP	DMLE	FECD	PDR	1
336	L'incidenza del glaucoma congenito	1: 100.000 nati vivi	da 1:5000 a 1 :10.000 nati vivi	1:250.000 nati vivi	1: 50.000 nati vivi	2
337	L'associazione della retinite pigmentosa con obesità, bassa statura, ipogonadismo e polidattilia è nota come sindrome di	Usher	Patau	Turner	Bardet-Biedl	4
338	I coni e i bastoncelli costituiscono	lo strato più esterno della retina	lo strato più interno della retina	uno degli strati intermedi della retina	lo strato dell'epitelio pigmentato	1
339	La sclerosi multipla determina nell'occhio	emianopsia	uveite	neurite ottica	distrofia corneale	3

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
340	Se un uomo daltonico sposa una donna normale, nella cui famiglia non si è verificata mai tale alterazione	le figlie sono daltoniche	i figli maschi sono portatori sani del daltonismo	i figli maschi sono daltonici	le figlie sono portatrici sane del daltonismo	4
341	La visione di cerchi colorati intorno alle luci è sintomo di	glaucoma	cataratta	neurite ottica	uveite	1
342	La cataratta può essere provocata da uno dei seguenti agenti fisici	vibrazioni	radiazioni ionizzanti	rumore	barotraumi	2
343	Nell'attacco acuto di glaucoma può essere presente	poliuria	vomito	polidipsia	diarrea	2
344	Il test di Amsler serve per valutare	la densità della cataratta	le metamorfopsie	le miodesopsie	le discromatopsie	2
345	La lente di Goldmann per l'esame biomicroscopico del fondo ha	quattro specchi	cinque specchi	sei specchi	tre specchi	4
346	L'emeralopia è conseguente ad una disfunzionalità	dei bastoncelli	dei coni della retina periferica	dei coni para-maculari	dei coni della fovea	1
347	Lo xantelasma si riscontra nella	congiuntiva	cute palpebrale	cornea	sclera	2
348	La ghiandola lacrimale è una ghiandola	tubulare semplice	tubulo-acinosa ramificata composta	tubulo-acinosa semplice	tubulare composta	2
349	La papilla da stasi è segno di	ipertensione endocranica	trombosi della vena centrale retinica	ipotensione della vena cava superiore	insufficienza carotidea	1
350	L'essudato cotonoso è espressione di	alterazione della barriera emato-retinica interna	ischemia retinica	alterazione della barriera emato-retinica esterna	ischemia coroideale acuta	2
351	Il cheratocita è una cellula	retinica	congiuntivale	del cristallino	corneale	4
352	Una lesione della corteccia visiva dell'emisfero sinistro determina	emianopsia bitemporale	emianopsia laterale omonima destra	quadrantopsia laterale omonima destra	quadrantopsia laterale omonima sinistra	2
353	Cosa si trova fra cornea e cristallino	una piccola lente biconvessa	il punto nodale	i fuochi principali	il diaframma pupillare	3
354	Per emianopsia si intende	la perdita totale della vista da un solo occhio	la perdita di metà campo visivo	la paralisi omolaterale dei muscoli oculari	la paralisi bilaterale dei muscoli oculari	2
355	E' definita anisocoria	una disuguaglianza del diametro pupillare	un aumento del diametro pupillare(superiore a 5 mm)	una irregolarità del contorno pupillare	l'assenza del riflesso fotomotore	1
356	La tunica fibrosa	è lo strato più esterno dell' occhio	è lo strato più interno dell'occhio	è lo strato medio dell'occhio	contiene neuroni sensibili alla luce	1
357	Rifrange la luce	la cornea	l'umor acqueo	la lente	tutte le precedenti	4
358	Tra le affezioni superficiali delle palpebre, l'infezione del follicolo ciliare si chiama	orzaiolo	calazio	congiuntivite	blefarite	1
359	L'emmetropia rappresenta:	La visione normale	La visione alterata che richiede una correzione con lenti concave	La visione ispirata che richiede una correzione con lenti convesse	La visione alterata in condizioni di penombra	1
360	La curvatura anormale della cornea determina:	La miopia	L'ipermetropia	La presbiopia	L'astigmatismo	4
361	Nell'esame dell'acutezza visiva, se una persona riesce a distinguere i caratteri (lettere o numeri) che hanno la minore dimensione, significa che il suo occhio possiede:	1/10	10\10	13\10	0\10	2
362	Lo stato di dilatazione della pupilla è chiamato:	Ciclopegia	Midriasi	Miosi	Cataratta	2
363	La cataratta è un'affezione:	Della congiuntiva	Della pupilla	Del cristallino	Della retina	3
364	Nell'istillazione di gocce oculari, occorre:	Tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore	Tirare delicatamente verso l'alto la palpebra superiore	Appoggiare delicatamente il contagocce alle ciglia	Nessuna delle altre risposte è corretta	1
365	L'anamnesi è:	una patologia che comporta la perdita di memoria.	la raccolta delle informazioni relative alla storia clinica di un individuo in esame e a quella dei suoi familiari.	una raccolta delle informazioni sullo sviluppo di infanzia di ogni individuo	una raccolta di informazioni relative solo alle eventuali malattie mentali	2

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
366	Nella distrofia solo dei cono quale componente elettrofisiologica è alterata in fase iniziale della patologia	scotopica ERG Flash	fotopica ERG flash	potenziali oscillatori	Perg	2
367	La sindrome della guina è	Sindrome di Duane 1	Sindrome di Duane 2	Sindrome di Brown	Sindrome di Parinaud	3
368	Quali esami elettrofisologici sono utili per la diagnosi di retinite pigmentosa	PEV da Pattern	ERG	ERG+EOG	EOG	3
369	La strategia ASTA si utilizza nel campimetro	OCTOPUS	HEP	HUMPHREY	CINETICO	2
370	Il campimetro HEP è associato	all'OCT	all'HRT	al GDx	al pachimetro	2
371	Il programma G2 dell'OCTOPUS nei 30° centrali prevede una griglia di	59 punti	57 punti	76 punti	62 punti	1
372	Il programma 30-2 dell'HUMPHREY nei 30° centrali prevede una griglia di	59 punti	62 punti	65 punti	76 punti	4
373	Quale tra questi programmi è una valida alternativa alla griglia di Estermann	campo pieno	campo visivo percentuale	SWAP	armaly-full field	2
374	Nel programma campo visivo percentuale la griglia è composta da	100 punti	120 punti	110 punti	160 punti	1
375	Quale di questi indici non esiste nel campimetro OCTOPUS	indice LV	indice CLV	indice PSD	indice SF	3
376	Quale indice esiste nel campimetro Humphrey	indice MD	indice CLV	indice LV	indice MS	1
377	La metamorfopsia si evidenzia in casi di:	campo visivo ridotto	glaucoma cronico primario	maculopatia	strabismo monoculare	3
378	Quale di queste tecniche si possono usare per una valutazione del CV in mancanza del perimetro	tavole di Amsler	campo visivo per confronto	imbuto di NY	Tutte le precedenti	4
379	La xantopia è la visione del colore	blu	giallo	rosso	verde	2
380	Nella cornea prolata la distanza tra gli anelli del disco di Placido:	diminuisce gradualmente dalla periferia al centro	aumenta gradatamente dalla periferia al centro	resta stabile	aumenta solo verso il basso	1
381	La degenerazione marginale pellucida riguarda	la retina periferica	la retina centrale	la cornea	il cristallino	3
382	Gli indici K1 e K2 li fornisce	il topografo	il programma perimetrico blu-giallo	l'HRT	il GDx	1
383	Quale di queste mappe fanno parte delle scale di colore	assoluta	normalizzata	aggiustabile	tutte le precedenti	4
384	Durante la FAG qual è il tempo più precoce	tempo arterioso	tempo capillare e arterovenoso	tempo coroidale	tempo tissutale	3
385	La causa dei microaneurismi retinici può essere	retinopatia diabetica	occlusione vascolare	retinopatia ipertensiva	tutte le precedenti	4
386	Il rischio di glaucoma aumenta con	l'età maggiore di 45 anni	diabete	miopia	tutte le precedenti	4
387	Una lesione chiasmatica mediana provoca	emianopsia binasale	emianopsia bitemporale	scotoma altitudinale	cecità monoculare	2
388	La lesione totale del nervo ottico destro provoca	emianopsia omonima destra	emianopsia omonima sinistra	cecità monoculare a destra	emianopsia omonima destra con risparmio maculare	3
389	La lesione di tutte le radiazioni ottiche provoca	emianopsia omonima con risparmio maculare	emianopsia omonima senza risparmio maculare	quadrantopsia	scotoma altitudinale	1
390	La pachimetria in quale di queste patologie trova la sua indicazione	cheratocono	glaucoma	chirurgia refrattiva	tutte le precedenti	4
391	Quali di questi segni fanno parte della miastenia grave	pupilla normale	oftalmoparesi fluttuante	ptosi palpebrale	tutte le precedenti	4
392	Quale di queste caratteristiche vengono osservate nei movimenti saccadici	la lettura	la velocità relativa al movimento saccadico	la precisione del movimento saccadico	tutte le precedenti	4

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
393	Quale tra questi esami elettrofunzionali può studiare il contrasto	ERG	Pev da flash	EOG	PERG	2
394	Per eseguire il PEV da pattern è necessario che il paziente abbia un visus almeno di	5\10	2\10	1\10	1\50	3
395	Quale tra queste definizioni di ipovisione è corretta	ipovisione lieve quando il visus corretto è maggiore ai 2/10 ma non superiore a 3/10	ipovisione medio grave quando il visus corretto è maggiore di 1/10 ma non superiore a 3/10	ipovisione grave quando il visus corretto è maggiore di 1/20 ma non supera 1/10	tutte le precedenti	4
396	Il microstrabismo scompensato può evolvere in	esotropia essenziale	esoforia-tropia	exotropia	ipotropia	3
397	Il patch test è	un test per la C.R.A.	il test del vetro rosso	il test dell'occlusione	il test della motilità	3
398	Non esistono lastrine per il sinottoforo per valutare	la fusione	la stereopsi	l'angolo k	il muscolo paretico con filtro rosso	4
399	A quale strumento appartengono le spazzole di Haidinger	GDX	HEP	amblioscopio maggiore	visuscope	3
400	Quali sono le mire standard definite a livello internazionale da utilizzare nel campo visivo cinetico	I/5- I/4- I/5-I/3- I/2	I/4-I/3-I/2-I/1	II/4-II/3-II/2-II/1	I/4-II/3-II/1-I/1	2
401	Al sinottoforo le lastrine per la percezione simultanea possono essere	foveali	maculari	foveomaculari	tutte le precedenti	4
402	Lo scotoma centro cecale si può associare a	patologie del nervo ottico	patologie del chiasma	corioretinopatia	nessuna delle precedenti	1
403	Lo scotoma giunzionale è sintomo di	amaurosi transitoria	S.M.	meningioma sfenoidale	nessuna delle precedenti	3
404	Le drusen sono un segno caratteristico di	R.D.	A.M.D.	glaucoma	nessuna delle precedenti	2
405	L'AMD può essere correlata a	ipertensione sistemica	fumo	fototossicità	tutte le precedenti	4
406	Per i vari tipi di uveite ad eziologia ignota qual è il possibile meccanismo patogenico implicato	reazione a traumi	reazione autoimmune	risposta ad agenti infettivi	Tutte le precedenti	4
407	Lo studio della refrazione in atropina è consigliabile in caso di	sospetta esotropia accomodativa	exotropia	ipertropia	ipotropia	1
408	Nel test di Schirmer i valori ritenuti normali dopo i 40 anni sono	dai 5mm agli 8 mm	dagli 8mm ai 13 mm	dai 10 mm ai 15 mm	nessuna delle precedenti	3
409	Lo strumento più utilizzato per la misurazione dell'esoftalmo è	l'esoftalmometro di Goldmann	l'esoftalmometro di Bangerter	l'esoftalmometro di Hertel	l'esoftalmometro di Maddox	3
410	Il test BUT prevede che	i tempi normali siano compresi tra 10 e 15 secondi	l'occhio sia colorato con la fluoresceina	l'occhio non ammicchi durante l'esame	tutte le precedenti	4
411	L'utilizzo della LAC deve essere sospesa necessariamente prima di eseguire	la perimetria	la topografia	il test della stereopsi	il test dei colori	2
412	La degenerazione marginale pellucida è una patologia	della macula	della retina	della cornea	del vitreo	3
413	Quale di queste definizioni è errata	protanopi (ciechi per il rosso)	deuteranopi (ciechi per il verde)	tritanopi (ciechi per il rosso-verde)	tetartanopi (ciechi per il giallo)	3
414	In quale esame strumentale vengono analizzate le mappe dell'immagine del fondo, dello spessore e della deviazione	HRT	GDX	HEP	OCT	2
415	Si dice cromatopsia quando	su una superficie nera vengono visti dei colori	non si riconosce il colore rosso	non si riconosce il colore verde	una superficie bianca viene vista colorata	4
416	Un edema epiteliale della cornea può determinare	xantopsia e cianopsia	visione del colore rosso	cloropsia	eritropsia	1

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
417	Nell'esame topografico	i colori più caldi corrispondono ad aree più curve	i colori più freddi corrispondono ad aree più curve	i colori freddi evidenziano la patologia del cheratocono	nessuna delle precedenti	1
418	Nell'esame topografico l'astigmatismo non patologico ha il tipico aspetto di	una farfalla	una clessidra	un imbuto	nessuna delle precedenti	2
419	Il PEV da FLASH	non si può eseguire se il visus è inferiore a 1/10	è un esame meno selettivo perché alla risposta contribuiscono i fotorecettori periferici	analizza diverse frequenze spaziali	utilizza stimoli tipo barre o scacchiera	2
420	Per studiare la circolazione coroideale è utile	l'angiografia dinamica al verde di indocianina	il fondo oculare	il campo visivo	HRT	1
421	Nell'angiografia con fluoresceina quante fasi si possono riconoscere	4	5	7	2	3
422	L'angiografia con verde di indocianina non ha dimostrato una sua utilità clinica	nello studio dei neovasi coroideali occulti in degenerazione maculare legata all'età	nello studio della retinopatia diabetica	nello studio dei neovasi occulti in miopia patologica	nello studio della membrana epiretinica	2
423	Nell'eseguire l'angiografia retinica nel diabetico è importante	acquisire immagini solo della macula	acquisire immagini anche della periferia	acquisire immagini di almeno 2 posizioni di sguardo	nessuna delle precedenti	2
424	Quale di queste condizioni possono mimare difetti del campo visivo associati a sindrome chiasmatica	condizioni retiniche (come retinite pigmentosa del settore nasale)	anomalie del disco ottico	papilledema con grande aumento della macchia cieca	Tutte le precedenti	4
425	Possibile causa di paralisi nucleare e fascicolare del III n.c. nei giovani adulti	demielinizzazione	vascolare	tumorale	Tutte le precedenti	4
426	Quale di queste situazioni fanno parte della paralisi nucleare del VI nervo cranico	sindrome del uno e mezzo	sindrome di Foville	paralisi dello sguardo	tutte le precedenti	4
427	Il test alla cocaina si può effettuare per la diagnosi della	oftalmopatia di graves	sindrome di Horner	miastenia grave	nessuna delle precedenti	2
428	La causa di minor dilatazione della pupilla al buio può essere	sindrome di ADIE	pupilla tonica	innervazione aberrante del III nervo cranico	tutte le precedenti	4
429	Il tonometro ad indentazione è detto anche	di Goldmann	di Perkins	di Schiotz	a soffio	3
430	La microperimetria MP1	è una combinazione di perimetria computerizzata e retinografia monoculare	per eseguirla è necessario un visus superiore ad 1 10	è solo perimetria computerizzata per studiare la macula	è solo retinografia per definire la sensibilità retinica centrale	1
431	Nell' eseguire la microperimetria con MP1	per analizzare occhio destro il paziente si appoggia su mentoniera destra	per analizzare l'occhio adelfo non è necessario chiudere l'altro occhio	prima di eseguire la perimetria è fondamentale valutare la fissazione	non è necessaria la collaborazione del paziente	3
432	L'HRT su quanti piani esegue la scansione	su 32 piani diversi	su 30 piani diversi	su 15 piani diversi	su 10 piani diversi	1
433	Nell'eseguire l'HRT	non bisogna correggere il difetto refrattivo	è necessario correggere l' astigmatismo superiore a 1,5 diottrie	l'esame è sempre attendibile anche per miopie elevate	nessuna delle precedenti	2
434	L'HRT mediante un laser a diodo emette una radiazione rossa di	670nm	800 nm	780nm	nessuna delle precedenti	1
435	Il GDx	utilizza una lunghezza d'onda di 670 nm	780 nm	800 nm	nessuna delle precedenti	2
436	Le causa di microaneurismi retinici può essere	retinopatia diabetica	occlusione vascolare	retinopatia ipertensiva	tutte le precedenti	4
437	Quale farmaco si usa nel trattamento cross-linking	luxomicina	riboflavina	oxocin	nessuna delle precedenti	2
438	La causa di trasmissione anomala della fluorescenza può essere	lesione infiammatoria	lesione degenerativa	lesione traumatica	tutte le precedenti	4
439	La pachimetria è utilizzata	nel glaucoma	prima di eseguire la chirurgia refrattiva	prima di eseguire il trattamento cross-linking	tutte le precedenti	4
440	Nell'edema da stasi da ipertensione endocranica quale di queste definizioni è sbagliata	visus normale	bilateralità	macchia cieca allargata	nessuna delle precedenti	4

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
441	Le misure AL,C,K sono riferibili alla	conta cellule	biometria	pachimetria	topografia	2
442	Il numero delle cellule endoteliali	dall'infanzia all'adolescenza aumenta molto rapidamente	dai 20 ai 50 anni è instabile	dai 60 anni il numero inizia ad aumentare	in età adulta dai 20 ai 50 anni è sostanzialmente stabile	4
443	In un campo visivo central 30-2 dove è posizionata la macchia cieca	occhio destro a destra nasalmente	occhio destro a destra temporalmente	occhio sinistro a sinistra nasalmente	occhio sinistro a destra nasalmente	2
444	Lo studio della pupillometria dinamica è indicata	nello studio dell'accomodazione	prima di eseguire chirurgia refrattiva	in caso di paresi totale del III nervo cranico	prima di eseguire PEV da FLASH	2
445	Quali di queste definizioni che riguardano l'ecografia oculare è errata	valuta la presenza di distacco di retina	valuta la presenza di neoformazioni intraoculari	misura lo spessore dei muscoli extraoculari	nessuna delle precedenti	4
446	Quale di queste patologie è studiata con la microscopia speculare	cornea guttata	distrofia di Fuchs	distrofia corneale e lattice	tutte le precedenti	4
447	Il test di Lang è utile per valutare	difetti della visione stereoscopica	la lacrimazione oculare	lo stato del condotto lacrimale	eventuali irritazioni della palpebra	1
448	L'esame del fundus oculi	visionare le strutture interne al bulbo oculare	analizzare la composizione delle lacrime	determinare l'acuità visiva	tutte le risposte sono corrette	1
449	La forma che con maggiore frequenza può sfociare in rottura della retina è	degenerazione a palizzata	degenerazione a bava di lumaca	degenerazione cistoide equatoriale	tutte le precedenti	4
450	La scala assoluta della mappa topografica	ad ogni colore corrisponde sempre lo stesso potere diottrico	ad ogni colore non corrisponde sempre lo stesso potere diottrico	la scala viene programmata dall'operatore	non è utilizzata in tutti i topografi	1
451	In conseguenza all'emanazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, che ha riformato la tipologia dei corsi di studio universitari, per le professioni sanitarie è previsto un primo livello di formazione di durata triennale che rilascia:	Un diploma universitario	Una laurea	Una laurea specialistica	Una laurea magistrale	2
452	Il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, ha introdotto alcune modifiche in materia di tipologia e di denominazione dei corsi di studio universitari. Secondo tale norma, la laurea magistrale sostituisce:	Il certificato di master di secondo livello	La Laurea	Il certificato di master di primo livello	La laurea specialistica	4
453	Il Consorzio Gestionale Anagrafica Professioni Sanitarie (CoGeAPS):	È l'organismo deputato alla gestione nelle anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti ECM dei professionisti sanitari	Consente a Ordini e Collegi la funzione di certificazione delle attività formative svolte dai propri iscritti	Gestisce l'anagrafe centralizzata dei crediti ECM acquisiti dai professionisti sanitari	Tutte le alternative sono corrette	4
454	Da chi è composta la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS)?	Dai presidenti degli Ordini delle Professioni sanitarie con il maggior numero di iscritti	Da componenti designati dal ministero della Salute e membri designati dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie	Dai rappresentanti delle Associazioni per i diritti del malato	Dai presidenti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), insieme a rappresentanti del ministero della Salute	2
455	Quali tra le seguenti figure professionali appartiene alla seconda classe delle professioni sanitarie?	Ostetrica	Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	Educatore professionale	Tecnico di neurofisiopatologia	3

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
456	Quale decreto stabilisce che le figure professionali il podologo, fisioterapista, ortottista - assistente di oftalmologia, logopedista, terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta occupazionale ed educatore professionale siano incluse nella fattispecie "professioni sanitarie riabilitative"?	D.M. 14 settembre 1994, n. 741	D.M. 29 Marzo 2001	legge 10 ottobre 2000, n. 251	D.M. 27 agosto 1999, n. 332	2
457	Quali tra le seguenti alternative è un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie?	Ottico	Ortottista - assistente di oftalmologia	Educatore professionale	Logopedista	1
458	Nei vari profili professionali di quale delle seguenti figure sanitarie riabilitative si parla di attività di studio?	Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e tecnico della riabilitazione psichiatrica	Logopedista, fisioterapista, terapeuta occupazionale educatore professionale	Ortottista - assistente di oftalmologia e podologo	Podologo	2
459	Secondo il DM 14 settembre 1994, n. 743, chi è << l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e su prescrizione del medico, tratta i disturbi motori e sensoriali della visione >> ?	Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	Educatore professionale	Ortottista - assistente di oftalmologia	Tecnico della riabilitazione psichiatrica	3
460	Sono obiettivi formativi di interesse nazionale stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome all'interno del Programma di Formazione Continua in Medicina (E.C.M.):	L'applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based practice	La sicurezza del paziente	L'innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici – Technology assessment	Tutte le altre risposte sono esatte	4
461	In quali termini la violazione del segreto professionale e sanzionata dall'articolo 622 del Codice penale?	Chiunque rivela un segreto professionale senza giusta causa, ovvero lo impiega per il proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 30,99 a euro 516,46	Chiunque rivela un segreto professionale senza giusta causa, ovvero lo impiega per il proprio o altrui profitto, è punito solo con la reclusione fino a un anno	La rivelazione del segreto professionale è un'azione che non viene sanzionata dal Codice penale	Chiunque riveli un segreto professionale senza giusta causa, ovvero lo impiega per il proprio o altrui profitto, è punito solo con la multa da euro 30,99 a euro 516,46	1
462	La legge 1° febbraio 2006, n. 43, si occupa:	Della riforma della disciplina concorsuale per le pubbliche amministrazioni	Nella classificazione delle nuove figure di supporto all'assistenza	Della modifica degli ordinamenti didattici delle lauree magistrali per le classi delle professioni sanitarie	Nessuna delle altre risposte è corretta	4
463	L'obbligo di formazione continua per le professioni sanitarie, secondo il modello ECM (educazione continua in medicina) è stato introdotto:	Con il D.Lgs. n. 229 del 1999	Con il D.Lgs. n. 502 del 1992	Con il D.Lgs. n. 517 del 1993	Con la legge n. 56 del 2002	1
464	Lo stato italiano ha istituito il servizio sanitario nazionale mediante:	La legge n. 296 del 13 Marzo 1958	La legge n. 132 del 12 Febbraio 1968	La legge n. 833 del 23 dicembre 1978	Il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992	3
465	Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto:	A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti	A nessuno in quanto si tratta sempre di atti segreti	Alle sole rappresentanze sindacali e politiche	A chiunque	1
466	I cosiddetti "livelli essenziali di assistenza" (LEA), introdotti con il D.Lgs 502/1992, rappresentano:	I trattamenti sanitari ritenuti appropriati ed efficaci sulla base della revisione della letteratura scientifica	Le attività di prevenzione sanitaria garantite dalle strutture extra ospedaliere	Le prestazioni sanitarie garantite a tutti i cittadini del servizio sanitario nazionale	I minuti di assistenza garantiti alla persona ricoverata in relazione alla diagnosi di ingresso	3
467	Con l'espressione "accreditamento professionale" si indica il processo di:	Valutazione dei professionisti rispetta gli standard formativi	Verifica obbligatoria di una struttura sanitaria, relativo al possesso dei requisiti minimi, al fine di permetterne o vietarne il funzionamento	Valutazione cui una struttura si sottopone ai fini della convenzione per il rimborso tariffario previsto dal sistema sanitario	Definizione di standard e indicatori che una professione elabora allo scopo di formalizzare il sistema di valutazione della qualità delle proprie prestazioni	4

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
468	La linea guida è:	Una descrizione circostanziata della sequenza di azioni che un operatore sanitario deve compiere in un particolare ambito della sua attività professionale	Un insieme di raccomandazioni, utili sia agli operatori sanitari, sia ai pazienti, circa il comportamento più appropriato in una determinata situazione clinica	Un insieme di principi generali che il vertice strategico di un'organizzazione emana per orientare l'attività dei propri dipendenti	Uno schema di sequenze comportamentali orientate ad un obiettivo	2
469	Secondo la costituzione italiana, la tutela della salute:	È obbligatoria e gratuita	È un diritto dell'individuo e delle formazioni sociali a cui il singolo partecipa	E' fondamentale diritto dell'individuo e un interesse della collettività	È un bene disponibile	3
470	È definita imperizia:	Un insufficiente preparazione e capacità che un soggetto non ha, ma che in realtà dovrebbe avere	Un comportamento avventato di un soggetto che, nonostante il pericolo o la probabilità che il comportamento produca un danno, agisce lo stesso	L'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline	Il soggetto che compie il reato vuole compiere un reato minore di quello che realizza	1
471	Cosa si intende per imprudenza?	Mancata adozione delle cautele imposte dalle regole cautelari; trascuratezza, mancanza di attenzione e di sollecitudine	Agire laddove le regole cautelari lo sconsigliano; avventatezza, insufficiente ponderazione; implica una scarsa considerazione degli interessi altrui	Trascuratezza; insufficienza di attenzione; ricorre in caso di scarso impegno, dimenticanza, svogliatezza, superficialità	Deficienza di cultura professionale o di abilità tecnica o di ogni esperienza specifica	2
472	Come, ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 833/78, vengono ripartite tra tutte le regioni italiane le somme stanziare con il fondo nazionale?	Con delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)	Con delibera di giunta emanata da ciascuna Regione	Con decreto della Corte dei conti	Con decreto della commissione nazionale per la sanità e l'ambiente (CONSAM)	1
473	Secondo il D.M. n. 70/2015 le strutture ospedaliere vengono classificate e distinte in:	Presidi Ospedalieri di base, Presidi Ospedalieri di I livello e Presidi Ospedalieri di II livello	Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri	IRCCS Fondazioni di diritto pubblico e privato	Aziende ospedaliere Policlinici universitari	1
474	Secondo il D.Lgs. 229/99 chi provvede all'accreditamento delle strutture pubbliche o private autorizzate a fornire prestazioni per conto del SSN?	Le Regioni	Enti terzi deputati alle certificazioni in ambito sanitario	La Conferenza Stato-Regioni	Le province	1
475	Il Decreto Ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 definisce:	Gli standard qualitativi e strutturali dell'assistenza ospedaliera	Gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza distrettuale	Gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera	Gli standard strutturali relativi all'assistenza ospedaliera	3
476	Secondo l'art. 3, comma 1-bis del d.lgs. n. 229/99, l'Atto Aziendale è:	Un documento che elenca gli incarichi dirigenziali della ASL di riferimento	Un documento che riporta l'organigramma della ASL di riferimento	Un documento di programmazione economico-finanziaria dell'azienda sanitaria di riferimento	Un documento al quale viene riconosciuta la natura di atto di diritto privato che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda	4
477	Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali, in riferimento a:	Richiesta di fornire informazioni oralmente	Richiesta di fornire documenti non accessibili e tutelati dal segreto d'ufficio	Fornire atti non pubblici	Tutte le precedenti	4
478	Il riordino e il riassetto del SSN avvengono attraverso:	Lgs. n. 229/1999	D. Lgs. 502/1992- D.Lgs. 517/1993	L. n.833/1978	L. n.251/2000	2
479	Il processo di aziendalizzazione delle strutture di produzione ed erogazione dei servizi sanitari è stato avviato:	Dalla Carta dei servizi sanitari	Dalla legge istitutiva del SSN	Dal D.lgs. 502/1992	Dalla L. N.251/2000	3
480	La principale autorità sanitaria a livello locale è:	Il medico condotto	L'assessore alla sanità	L'ufficiale medico della caserma più vicina	Il sindaco	4
481	Il D.Lgs. 196/2003 ha introdotto il concetto di:	Diritto di cura	Diritto di partecipazione	Privacy	Diritto di informazione	3

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
482	Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con:	Titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali	Titolarità ma nessuna autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali	Nessuna titolarità e nessuna autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali	Nessuna delle risposte è corretta	1
483	Secondo la legge n°42 del 26 febbraio 1999, il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie della riabilitazione è definito dal combinato disposto dei seguenti regolamenti:	Profilo professionale, codice deontologico, ordinamenti didattici di base e post base	Profilo professionale, codice deontologico, contratto nazionale di lavoro	Profilo professionale, contratto nazionale di lavoro, ordinamenti didattici di base e post base	Nessuna delle risposte è corretta	1
484	La Legge 251 del 10 Agosto del 2000 sancisce:	Disposizioni urgenti in materia sanitaria	La disciplina delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione nonché della Professione Ostetrica	Norme sul funzionamento dei comitati di Bioetica	Norme sulla sicurezza dei lavoratori	2
485	Quale norma, tra quelle indicate di seguito, attribuisce valore giuridico al Codice Deontologico?	Legge 42/99	Legge 1/2002	Contratto Collettivo Nazionale del lavoro	Nessuna risposta è corretta	1
486	La legge 1° febbraio 2006, n. 43, prevede:	L'abolizione dei Collegi professionali	La trasformazione dei Collegi professionali in Ordini professionali, senza obbligo di iscrizione	La trasformazione dei Collegi professionali in Ordini professionali, con obbligo di iscrizione	Il mantenimento degli attuali Collegi professionali, senza obbligo di iscrizione	3
487	A quale ordine professionale sono confluiti gli ortottisti e gli assistenti di oftalmologia	Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione	Ordine delle Professioni Infermieristiche	Ordine dei Medici	Ordine delle Professioni Sanitarie	1
488	L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia:	Svolge autonomamente l'attività professionale in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, elabora anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo	ha la responsabilità diretta delle procedure professionali che svolge	non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni, speranze o infondati timori	Tutte le risposte sono corrette	4
489	Quale affermazione secondo il codice deontologico dell'ortottista non è corretta?	L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia deve trattare con competenza finalizzando la sua opera a migliorare o mantenere la salute del paziente, dedicando a questo scopo tutto il tempo necessario	L'Ortottista può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino valutazioni relative al suo stato di salute.	All'Ortottista - Assistente in Oftalmologia è consentita la pubblicità professionale nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Legge e dall'Associazione professionale	Tutte le affermazioni non sono corrette	2
490	Secondo il codice deontologico, l'ortottista:	Prima di iniziare ogni terapia ha la facoltà di decidere se informare il paziente sulle modalità di esecuzione, sugli scopi ed anche sugli eventuali effetti collaterali, nonché sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte effettuate	Nell'informare il cittadino dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione e adeguarvisi	L'informazione a terzi è sempre autorizzata	Tutte le risposte sono errate	2
491	Quale decreto individua la figura e il relativo profilo professionale dell'ortottista assistente di oftalmologia?	D.M. 14 settembre 1994, n. 743	D.M. 17 gennaio 1997, n. 58	D.M. 14 settembre 1994, n. 667	D.M. 14 settembre 1994, n. 740	1

numero	quesito	risposta 1	risposta 2	risposta 3	risposta 4	risposta esatta
492	Ai sensi della L. 43/2006 in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione l'individuazione di nuove figure professionali avviene:	Per effetto del recepimento di convenzioni stipulate tra il Ministero della salute e le Università	Per effetto della sede di recepimento di direttive comunitarie	Per effetto del recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle Regioni	Tutte le alternative sono corrette	3
493	Con l'acronimo ECM si intende definire:	Essenziale Competenza Medica	Educazione e Cultura Medica	Elementi di Cultura Medica	Educazione Continua in Medicina	4
494	L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia, nell'interesse del paziente, ha il dovere di:	Utilizzare metodologie e tecnologie diagnostiche, terapeutiche e riabilitative la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente provate	Attenersi ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate in accordo con i principi della medicina basata sulle prove	Non adottare trattamenti e presidi diagnostici non adeguatamente sperimentati e supportati da idonea documentazione clinico-scientifica	Tutte le alternative sono corrette	4
495	La Legge 11 gennaio 2018 n.3 è relativa a:	Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute	Disposizioni in materia di professioni sanitarie	Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali	Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica	1
496	La Legge n. 42 del 22 Febbraio 1999:	Rinomina le professioni sanitarie in professioni sanitarie ausiliarie	Esclude il codice deontologico come riferimento per la determinazione del campo delle attività e responsabilità	Esonera i professionisti sanitari dall'Educazione Continua in Medicina	Tutte le affermazioni non sono corrette	4
497	Le disposizioni del codice deontologico si applicano a tutti gli Ortottisti - Assistenti in oftalmologia:	Liberi professionisti	Dipendenti di strutture pubbliche	Dipendenti di strutture private	Tutte le alternative sono corrette	4
498	La legge 43/2006 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione" istituisce:	La funzione di dirigente di struttura	La funzione di coordinamento	La funzione di responsabile di area dipartimentale	Tutte le alternative sono corrette	2
499	L'obbligo del segreto professionale è sancito:	Dal Codice di procedura civile	Dal D.L.gs 502/92	Dal Codice penale	Dalla Legge 833/78	3
500	L'esercizio abusivo di una professione è sancito da:	Dall' articolo 348 del Codice penale	Dall' articolo 515 del Codice penale	Dall' articolo 348 del Codice di Procedura Penale	Dall' articolo 515 del Codice di Procedura Penale	1